

SAVIEZ-VOUS QUE...



LE GROSEILLER, LE CASSISSIER, ET LE GADELLIER

La groseille à maquereau que l'on nomme simplement « groseille » au Québec, serait originaire d'Europe où elle est particulièrement appréciée. Les Anglais lui firent une place de choix dans leur cuisine.

Ils ont créé une sauce aigre-douce qui accompagne le maquereau; cette sauce aurait donné son nom à la groseille. La groseille à maquereau diffère de la groseille à grappes par le fait qu'elle pousse sur un arbrisseau épineux, qu'elle s'y développe en solitaire et non en grappes, et qu'elle est plus grosse.

Le « cassis » (*Ribes nigrum*) est une groseille noire qui provient du cassissier (ou groseillier noir), originaire d'Europe du Nord et qui ressemble à la myrtille. Sa culture débuta en Europe qu'au milieu du XVIII^e siècle. Ses fruits sont recouverts d'une mince peau translucide semblable celle des raisins.

Leur chair juteuse, aigrelette et aromatique renferme de minuscules graines. La groseille à grappes (*Ribes rubrum*, *sativum*, *vulgare* etc.) que l'on nomme parfois « gadelle » au Québec, serait originaire d'Europe du Nord et d'Asie.

CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE

Le site et le sol pour le groseillier, le cassissier et le gadelier doivent être le même que pour le fraisier quoiqu'ils tolèrent mieux les sols plus lourds qui conservent bien leur humidité durant les périodes les plus chaudes. En situation de sols lourds, le buttage est toujours de mise.

En sol léger, bien surveiller les niveaux de bore et de magnésium. Les Ribes sont en général bien rustique à nos hivers, il faut surveiller les dommages dus au gel des fleurs, donc choisir des sites en fonction d'une circulation d'air comme c'est le cas pour le bleuet.



PLANTATION ET ENTRETIEN

Planter très tôt au printemps ou à l'automne, à une distance de 1.2-1.5 m sur des rangs espacés de 3 m. Placer les plants plus profondément qu'ils l'étaient en pépinière.

Rabattre les tiges du tiers de leur hauteur et garder seulement 2-3 tiges. Bien irriguer et fertiliser 2 semaines après la plantation avec un engrais complet ou un engrais riche en azote.

Un paillis de 10 cm d'épaisseur conservera l'humidité nécessaire pour une bonne croissance des jeunes plants. À partir de la deuxième année, taillez annuellement lorsqu'encore dormant.

Les tiges trop vieilles, malades, mal orientées et en trop sont coupées au ras de terre. Pour le cassissier, garder jusqu'à 5 nouvelles tiges vigoureuses à chaque année. Le bois de 2 et 3 ans portera les plus beaux fruits.

Après 3 ans, éliminez les vieilles tiges, car leur productivité diminue. Le groseillier et le gadelier produisent bien sûr du bois plus vieux. On garde donc 3-4 nouvelles tiges vigoureuses chaque année. Après 5 ans, on élimine les vieilles tiges peu productives.

Traiter au besoin contre les pathogènes du feuillage et les ravageurs. Le cassissier est un hôte alternatif pour la rouille vésiculée du pin blanc. Il faut donc éviter de les planter s'il y a des pins blancs dans le voisinage.

POLLINISATION

Les groseilliers et gadelliers sont auto fertiles, par contre le cassissier ne l'est pas et a donc besoin d'une variété pollinisatrice. Les bourdons, comme pour les bleuets seront vos meilleurs alliés de pollinisation.

