

SAVIEZ-VOUS QUE...



LE MÛRIER

Les premiers plants cultivés et appelés Mûriers noirs sont des arbres importés d'Orient (*Morus niera*). Les feuilles servent à nourrir les vers à soie et leurs fruits, appelés mûres, sont comestibles. Une confusion vient du fait que les fruits des ronces sont aussi appelés mûres, et par le fait même, les plants de ronces sont faussement appelés mûriers. Les ronces sont présentes sur tous les continents, dans les zones tempérées. On les retrouve aussi dans les régions montagneuses des zones plus chaudes. Il existe plus de 400 espèces différentes parmi lesquelles se trouvent des espèces naines, arbustives et sarmenteuses. Les plants sont généralement vivaces et les fruits se forment sur les tiges de l'année précédente. Bien qu'on trouve des ronces à l'état sauvage au nord de la France, elles n'y ont pas été cultivées avant le 20^e siècle. La croyance voulant que les terrains plantés de ronces soient incultes, personne n'avait jamais tenté une quelconque culture. Le problème réside en fait en la difficulté de défricher ou de travailler avec ces plants qui sont très épineux. Les premières cultures de ronces se sont faites en Amérique du Nord au 19^e siècle, et ont débuté avec l'hybridation de différentes espèces sauvages. La ronce du Canada a été utilisée au cours de ces travaux à cause de sa grande rusticité et pour son absence fréquente d'épines. Malheureusement, les variétés développées bien souvent plus au sud ne s'adaptent pas bien à nos hivers rigoureux. Les plants de ronces du Canada comportent de nombreuses et grosses tiges, ascendantes ou arquées, presque totalement inermes. Les feuilles alternes sont composées de 3 à 5 folioles. Les fleurs blanches se regroupent en grappes terminales de 5 à 35 fleurs. La floraison a lieu en juillet et les fruits, d'abord rouges, deviennent noirs à maturité en août-septembre. Récolter un ou deux jours après que la coloration noire uniforme ait été atteinte pour permettre aux fruits de développer pleinement leur arôme. Contrairement aux framboises, les réceptacles restent attachés aux fruits.

CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE DU MÛRIER

À part des distances de plantation sur le rang qui sont plus grandes (1 à 2 m), le choix et la préparation du site ainsi que la plantation et l'entretien du mûrier sont les mêmes que pour le framboisier.

Pour la taille du mûrier rampant sans épine, groupez les nouvelles tiges et attachez-les, lâchement sur le premier fil (60 cm du sol) d'un palissage à deux fils. Tailler les ramifications à 10 cm des tiges principales.



PLANTATION ET ENTRETIEN DU MÛRIER



L'année suivante, après avoir taillé les tiges endommagées ou en trop, attacher les autres sur le deuxième fil (160 cm du sol) pour la récolte. Procéder comme pour l'année précédente pour les nouvelles tiges. Le tuteurage devra avoir près de 2M de haut avec des poteaux espacés de 3 à 5 M.

Récolter d'août à octobre lorsque les fruits sont très mûrs. En fin de saison, enlever complètement les tiges qui ont rapporté. Les mûriers sont moins exigeants que les framboisiers en fertilisation, mais par contre sont plus fragiles aux variations de l'environnement.

C'est pourquoi la culture en plein champ peut donner des résultats variables alors que près d'un abri végétal en bordure des sous-bois elles produisent bien. L'ensoleillement demeure important, mais l'exposition au vent sera néfaste. Les autres exigences sont semblables aux framboisiers. La rusticité de la mûre est moins grande que celle du framboisier.

Il sera important de la protéger l'hiver en couchant les tiges au sol, ou si en culture en pot en couchant les plants aux sols et en les recouvrant d'une couverture hivernale. L'utilisation de répulsif et de station appât à rongeurs et mulot devient nécessaires.

CULTURE EN SUBSTRAT/SOUS ABRIS DU MÔRIER

La mûre se prête aussi bien que la framboise à la culture sous abris avec ou sans substrat. Les recommandations de substrat demeurent les mêmes que pour le fraisier et le framboisier. Les distances de plantations et le palissage sont les mêmes que précédemment.

